

Név:	Törzsszám:
Születési hely, idő:	TAJ:
Anyja neve:	Felvéve:
Lakcím:	

Betegtájékoztató ízületi punkció és intraartikuláris injekció adásához

Tisztelt Betegünk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében Ízületi punkció/ízületbe adott injekció adása vált szükségessé. Szeretnénk tájékoztatást adni, hogy – mindent mérlegelve – döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

Mit jelent az ízületi punkció?

A meghatározott ízületbe injekciós tűvel besúrnunk és a felgyülemlett gyulladásos folyadékot eltávolítjuk.

Mit jelent az ízületbe adott injekció?

A meghatározott ízületbe injekciós tűvel hatóanyag beadása.

Miért van szükség a beavatkozásra?

Az injekciózás indikációja: Amikor az ízületi gyulladás olyan fokot ér el, hogy szájon át szedhető gyógyszerekkel már nem lehet kellő mértékben csökkenteni a panaszokat, akkor ízületbe fecskendezett gyógyszerek adása válhat szükségessé. Terápiás cézzal gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, porcpótló gyógyszert juttathatunk az ízület üregébe. Az injekciós kezelés alternatívája lehet a műtéti beavatkozásnak, vagy időben késleltetheti azt.

Mi történik a beavatkozás előtt?

Különleges előkészítést és előkészületet a betegtől nem igényel, a beavatkozást végző személyzet tájékoztatóját kérjük betartani, és a tevékenység során együttműködni. **Feltétlenül jelezze, ha Ön véralvadásgátló kezelésben részesül!** A beavatkozás előtt a véralvadásgátló terápiát fel kell függeszteni!

Hogyan történik a beavatkozás?

Az ízületbe adott injekció helyének függvényében, az adott ízület anatómiai helyzetének megfelelően történik a beteg elhelyezése a vizsgáló asztalon, majd megfelelő bőrfertőtlenítést követően az orvos steril injekciós tű segítségével – szükség szerint előzetes helyi érzéstelenítést követően – az ízület üregébe hatol.

Tájékoztatjuk arról, hogy a tűszúrás általában kellemetlen érzést okoz, kérjük erre felkészülni, és az érintett testrészt ennek ellenére nyugalomban tartani és ellazítani. Átmeneti panaszfokozódás az esetlegesen beadott gyógyszer természetétől függően előfordulhat.

Mi a teendő beavatkozás után?

A beavatkozást követően az érintett ízület jegelése javasolt 20 perc időtartamban aznap és következő napon is 1-2 alkalommal. Az érintett ízületet a beavatkozást követő 48 órában óvni kell a nagyobb terheléstől.

Mi a beavatkozás esetleges szövődménye?

Enyhébb mellékhatások lehetnek az átmeneti vércukor, vérnyomás emelkedés, az arc kipirosodása. Nagyon ritka esetben előfordulhat, főleg cukorbetegknél, alkoholt rendszeresen fogyasztóknál, vérképző betegségben szenvedőknél, véralvadás gátlót szedő betegek esetében, illetve az utasítást be nem tartóknál utólagos ízületi vérömleny, fertőzéses ízületi gyulladás.

Milyen következménye lehet, ha elmarad a beavatkozás?

Fokozódik a gyulladás és a fájdalom, súlyos mozgáskorlátozottság, maradandó egészségkárosodás, az ízület elmeredése alakul ki.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Tabletta, illetve izomba adható injekció formájában is alkalmazhatók a gyulladás- csökkentő, fájdalomcsillapító és porcképző gyógyszerek, ezek azonban az egész szervezetre fejtik ki hatásukat, ellentétben a közvetlenül az érintett ízületbe adott injekcióval. A gyulladásos folyadék csak ízületi punkcióval távolítható el az ízületből.

„ A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház adatkezelői minőségében tájékoztatja Önt, mint egészségügyi szolgáltatásunkat igénybe vevő beteget arról, hogy a betegellátás során és azzal összefüggésben főszabály szerint minden esetben előzetes és megfelelő tájékoztatásunk alapján kérjük érintetti hozzájáruló nyilatkozatát kép- és hangfelvétel készítéséhez. Jogszabály felhatalmazása alapján nem szükséges előzetes hozzájárulást adnia a létfontosságú rendszerelemek védelmét biztosító kamerás megfigyelőrendszerek által történő adatkezeléshez, továbbá a betegellátás során az előre nem látható, váratlan és következményekkel járó események személyazonosításra alkalmatlan módon történő rögzítéséhez, ha az Ön egészségének helyreállítása és megóvása érdekében orvosszakmai szempontból ez indokolt.”

Miskolc, 20....., hónap nap

.....
a felvilágosítást végző orvos

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

.....
beteg / törvényes képviselő laccíme

Beleegyezési nyilatkozat

Az ízületi punkció elvégzésével/ intraartikuláris injekció beadásával kapcsolatos írásbeli és szóbeli tájékoztatást megkaptam, lehetőségem volt arra, hogy azt elolvassam és orvosommal megbeszéljem. Kérdéseimre kielégítő választ kaptam és ez alapján a beavatkozás elvégzésébe beleegyezem, kérem annak elvégzését.

Miskolc, 20....., hónap nap

.....
a felvilágosítást végző orvos

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

.....
beteg / törvényes képviselő laccíme

Elutasító nyilatkozat

A kezelőorvos részletes felvilágosítása – mely a beavatkozás elmaradása esetén előforduló következményeket is tartalmazta – ellenére a beavatkozás elvégzését megtagadom.

Miskolc, 20....., hónap nap

.....
a felvilágosítást végző orvos

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

.....
beteg / törvényes képviselő laccíme