



*Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Semmelweis Tagkórház
Pszichiátriai Centrum
Addiktológiai részleg
Dr. Szlivka Anna
Részlegvezető főorvos
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.*

Név:		Törzsszám:	
Születési hely, idő:		TAJ:	
Anyja neve:		Felvéve:	
Lakcím:			

Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat disulfiram (Esperal) beültetéshez

Az disulfiram, az absztinencia tartását, az alkoholtól való távoltartást segíti, csak azoknak a betegeknek ajánlott akik vállalják az alkoholtól való teljes önmegtartóztatást.

A beültetést belgyógyászati, labor, pszichiátriai/addiktológiai vizsgálatok előzik meg, melyek során kiderül, hogy alkalmazható-e a készítmény az adott személy esetében. A disulfiram beültetésének feltétele átmeneti disulfiram tabletta (Antaethyl) szedése a beültetés megtörténteig. Amennyiben a beteg a szájon át szedhető disulfiram mellett allergiás tünetet, mellékhatást nem tapasztal és tartja az alkoholmentességet, ill. a beültetésnek belgyógyászati és pszichiátriai ellenjavallata nincs, az implantáció a beteg kérésére, annak beleegyezésével megtörténhet.

Hatóanyaggal szembeni túlérzékenység, súlyos májkárosodás vagy más súlyos fokú belgyógyászati betegség esetén (pl. szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, vesebetegség, vérképzőszervi betegség, légzőszervi betegség), epilepszia, kezeletlen pszichiátriai betegség, öngyilkossági veszély, terhesség, szoptatás esetén az disulfiram beültetése ellenjavallt.

Disulfiram hatása alatt alkohol tartalmú gyógyszerek, ételek, italok fogyasztása tilos, ill. túl ecetes, erjesztett ételek, italok kerülése, alkohollal való kontaktus kerülése javasolt.

Alkoholfogyasztás esetén a gyógyszer megváltoztatja az alkohol lebomlásának folyamatát, gátló hatással van az alkohol lebontásához szükséges enzimrendszerre, blokkolja az alkohol-dehidrogenáz enzim működését. Disulfiramra történő alkoholfogyasztás után acetaldehid mérgezés alakul ki, melynek tünetei rövid időn (pár percen) belül jelentkeznek: bőrpír, hányinger, hányás, gyorsult szívműködés, légszomj, fejfájás, vérnyomás emelkedés, általános rossz közérzet, szorongás, zavartság, szívritmuszavar, eszméletvesztés, súlyos esetben kóma, légzésleállás, szíveleállás.

A disulfiram önmagában nincs káros hatással a szervezetre, a tabletták lassan szívódnak fel, a hatásuk kb. egy éven keresztül áll fenn, sikeres absztinencia tartás esetén, a beavatkozás akár ismételhető is.

A disulfiram hatóanyagú implantációs tabletták beültetése többnyire farizomba történik, melyet sebész szakorvos végez ambuláns műtét formájában, helyi érzéstelenítés alkalmazásával. A műtétnek lehetnek szövődményei, pl. a műtési seb elgennyesedése, a tabletták kilökődése.

Kezelő orvosom tájékoztatott az eljárással kapcsolatos kérdéseimet illetően, az eljárás menetéről, a lehetséges mellékhatásokról, kockázatokról és a kezelést akadályozó tényezőkről.

A **FISZ-032 „Szabályzat, az egészségügyi ellátás térítési díjainak ügyviteli rendjéről” c. Főigazgatói Szabályzat FISZ-032/A07-es „NEAK által nem finanszírozott ellátás térítése”** adatlapja szerint az **(ESPERAL) térítésköteles.**

Az ESPERAL (disulfiram) tablettá beültetése során a tablettá ára nem NEAK finanszírozott, ezért az ellátást igénybevevő a gyógyszer árát meg kell térítse a kórház részére.

Az adatlap a Kórház Honlapján található.

Elérhetősége: www.bazmkorhaz.hu/Közérdekű_adatok/Térítési_díj_szabályzat NEAK által nem finanszírozott ellátás térítése (ESPERAL)

Miskolc, hónap nap

.....
a felvilágosítást végző orvos

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

.....
beteg / törvényes képviselő lakcíme

Beleegyezési nyilatkozat

Fenti tájékoztatást megértettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. A disulfiram implantáció elvégzésébe beleegyezem.

Miskolc, hónap nap

.....
a felvilágosítást végző orvos

.....
beteg / törvényes képviselő aláírása

.....
beteg / törvényes képviselő lakcíme