

**EPIDURALIS SZÜLÉSI FÁJDALOMCSILLAPÍTÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSI,  
BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT**

<b>Név:</b>	#!NEV; (#!BLEANYKORINEV;)	<b>Sorszám</b>	#!OSZTVZSGEVES_P;
<b>Születési idő:</b>	#!BSZULHELY; #!SZULIDO; (#!BELETKORA; éves)	<b>TAJ:</b>	#!TAJ_TAGOLT;
<b>Anyja neve:</b>	#!BANYJANEVE;	<b>Vizsgálat ideje:</b>	#!AKTDATUM;
<b>Lakcím:</b>	#!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA;	<b>Naplószám</b>	#!AmbKotetNaplo;
<b>Vizsgáló orvos:</b>	Dr. #!OSZTVZSGKEZORVPROP(1);		
<b>Beküldő intézet:</b>	#!VKER_KeroOszNev; #!VKER_KeroOszKod;		

**Tisztelt Betegünk!**

Az epiduralis fájdalomcsillapítást orvos végzi az Ön/ a szülőnk kérésére-, illetve bizonyos szülészeti javallatra, abban az esetben, ha annak semmilyen ellenjavallata nem áll fenn.

A beavatkozás előtt az alkar vénájába infúziót kötünk be. Ezután ülő vagy oldalt fekvő helyzetben a deréktáj bőrének fertőtlenítését és érzéstelenítését követően egy vékony műanyag csövet vezetünk be az epiduralis térbe (gerinc melletti térbe). Ezen keresztül kis adagokban vagy folyamatosan helyi érzéstelenítő szert adunk úgy, hogy a fájdalmat enyhítse, de izomgyengeséget ne okozzon. Ez a fájdalomcsillapítás a szükséges ideig fenntartható. Helyes gyógyszeradagolás mellett a fájdalomcsillapítás Önt mozgásában nem gátolja.

Ez a módszer a szülés lefolyására és a magzat állapotára káros hatással nincs

Előnye, hogy ha a vajúdás valamilyen okból császármetszésbe torkollik, az epiduralis fájdalomcsillapítás műtéti érzéstelenítéssé alakítható, így a műtéthez nem szükséges más módszer alkalmazása.

Leggyakrabban előforduló szövődmények: fájdalom a szúrás helyén; a gerincburok véletlen megsértése (< 1%); fejfájás. De ezek tartós egészségkárosodást nem okoznak.

A javallatok és ellenjavallatok betartása mellett súlyos szövődmények kialakulásának valószínűsége csekély.

A szülési epiduralis fájdalomcsillapításról szóló betegtájékoztatót megismertem, az azzal kapcsolatos kérdéseimre választ kaptam, annak elvégzésébe beleegyezem.

Miskolc, #!AKTDATUMHONAPNEVVVEL;

.....  
a beteg, illetve törvényes képviselője vagy a  
nyilatkozattételre jogosult  
cselekvőképese személy aláírása

.....  
a felvilágosítást végző orvos aláírása

