

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

3 5 2 6 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. E-mail: igazgato@bazmkorhaz.hu

Erzsébet Hospice Otthon
Osztályvezető főorvos:

OEP KÓD: 0563A7306
Tel.: (46) 515-200/11502

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT HASCSAPOLÁSBA

Alulírott (szül. idő.:)

tanúsítom, hogy engem Dr. Simkó Csaba kellő mértékben felvilágosított az alábbiakról:

- A betegség következtében a hasüregben (a hasfal és a belek között) kóros mennyiségű folyadék szaporodott föl, mely feszíti a hasfalat, felnyomja a rekeszt és összenyomja a beleket, ezáltal bizonyos mértékű fájdalmat, táplálkozási és légzési zavarokat okozhat.
- **A javasolt gyógymód** a hasban felgyűlt víz lebocsátása, mely rövid időn belül könnyebbség érzetét eredményezi.
- **Az eljárás leírása:** ultrahang vizsgálattal megállapítják a hasüregben lévő kóros folyadék mennyiségét és elhelyezkedését, majd helyi érzéstelenítést követően, steril körülmények között egy műanyag csövet (branült) vezetnek be a hasfalon át a hasüregbe, melyen keresztül lebocsátják az összegyűlt folyadékot.
- **A beavatkozás lehetséges szövődményei:** Bár a beavatkozás mindennaposnak számít, és alacsony kockázattal jár, a legnagyobb gondosság ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények.
 - a, A hasfalban futó erek sérülése során felléphet vérzés, mely általában jelentéktelen. Súlyosabb vérzéses szövődmények elkerülése érdekében fontos, hogy a hascsapolás idején a beteg ne álljon véralvadást gátló („vérhígító”) gyógyszerek hatása alatt.
 - b, Igen ritkán előfordulhat a belek sérülése, mely akár műtéti beavatkozást is szükségessé tehet.
 - c, Szintén ritka szövődményként előfordulhat a hasfal vagy a hasüreg befertőződése.
 - d, Nagy mennyiségű hasvíz lebocsátásakor néha vérnyomásesés fordulhat elő.
 - e, A hascsapolás némi fehérjevesztéssel is jár, melynek általában nincs nagy jelentősége.
 - f, A beavatkozás általában minimális fájdalommal jár. Ritkán felléphet erősebb fájdalom, melynek mielőbbi megszüntetése érdekében fájdalomcsillapító injekciók adására, ill. a hasfali idegek érzéstelenítésére kerülhet sor.
- **Más szóba jövő kezelési eljárás:** A felgyűlt hasvíz az esetek egy részében vízajtók folyamatos adásával is csökkenthető. Ez lényegesen lassabb, időnként a szervezet só-, és folyadékháztartásának felborulásával, a veseműködés romlásával, csökkenő vérnyomással, gyengeséggel járhat. Gyakran a hascsapolás és a vízajtó kezelés együttesen kerül alkalmazásra, hogy a beteg panaszainak mielőbbi enyhülése bekövetkezzen, ugyanakkor a hasvíz visszatermelődésének üteme csökkenjen.

A hascsapolás lényegéről és esetleges szövődményeiről számomra érthető tájékoztatást, felmerülő kérdéseimre kielégítő választ kaptam, és kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon (minden kényszertől mentesen) dönthessek arról, milyen kezelést szeretnék igénybe venni.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének elutasítására. Ez esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

A hascsapolásba beleegyezem.

Miskolc,

a kezelő orvos aláírása:

.....

beteg olvasható aláírása

Beteg neve:
Születési ideje:
Születési helye:
Lakcíme:

.....

vagy a törvényes képviselő aláírása (1)

Törv. képv. neve:
Születési ideje:
Születési helye:
Lakcíme:

(1) Korlátozottan cselekvőképés, illetőleg cselekvőképtelen beteg esetén a nyilatkozatot a törvényes képviselő (hozzátartozó) adja. Korlátozottan cselekvőképés beteg esetén javasolható a beteg önálló nyilatkozattétele is, ez azonban a törvényes képviselő (hozzátartozó) nyilatkozatát nem pótolja.