

#!KORHNEV;
#!KORHCIMVAROS; #!KORHCIM;

#!AKTOSZTALYNEVE;
OEP KÓD: **#!APOSZTKOD;**

Intézetvezető főorvos: Dr. Lázár István Ph.D.

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

Beteg neve: **#!NEV;**
Szül. hely, idő: **#!BSZULHELY; #!SZULIDO;**
Taj szám: **#!TAJ;**
Lakcím: **#!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA;**

Alulírott kijelentem, hogy kezelőorvosom, dr LÁZÁR ISTVÁN a rajtam elvégzendő beavatkozás (nyaki fém protézis beültetés, ütőér tágítás) mibenlétéről, esetleges szövődményeiről felvilágosított, és én ezek alapján abba beleegyezem. Minden ezzel kapcsolatos kérdésemre választ kaptam, további kérdésem nincs. A döntésre elegendő időt kaptam.

Az érfestés kapcsán olyan nyaki ütőér szűkültre derült fény, amely feltárásos műtét nélkül, katéteres úton is kezelhető. Ezen katéteres beavatkozás mellett esetemben az szól, hogy az ellenoldali nyaki ütőér is elzáródott (súlyosan szűkült), műtét utáni visszaszűkülés következett be, szív- vagy egyéb szervi problémák miatt az altatás fokozott kockázatú lenne, a nyaki ér eredésénél is szűkület van, amely sebészileg nem elérhető, a nyakon előzőleg besugárzás történt, stb. A magas sebészi rizikó miatt a katéteres megoldás várható eredménye nem rosszabb a jelenleg elsőként ajánlott sebészeti megoldással.

A beavatkozás közben ritkán (2-3 %-ban) szövődmények is előfordulhatnak, mint pl. a tágított ér elzáródása, a behatolás helyén vérömleny, a tágított érfalon rögzítés és abból lesodródó alvadék agylágyuláshoz, bénuláshoz, beszédzavarhoz vezethet. Létrejöhet a felhasznált kontrasztanyag okozta túlérzékenységi reakció, vagy szerv - elsősorban vese - károsodás.

A beavatkozás egy fémből készült háló, ún. stent beültetését teszi szükségessé. Ez a stent a tágított érben marad, onnan a későbbiekben nem távolítható el. Ezen idegen anyag okozta reakcióként az ér a későbbiekben a stenten belül újra beszűkülhet (kb. 5%-ban), amelyen ez esetben ismét tágítani kell.

Miskolc, **#!AKTDATUMHONAPNEVVEL;**

.....
a beteg v. törvényes képviselő aláírása

.....
Dr. Lázár István (50005)