

Epidurális fájdalomcsillapításra vonatkozó tájékoztatósi, beleegyezési nyilatkozat

Kedves Betegünk! Tisztelt Asszonyom/Uram!

Tudjuk, hogy betegsége miatt, egészségének visszanyerése céljából kényszerül arra, hogy gondjainkra bízza magát. Kötelességünk, hogy Önt betegségéről, állapotáról, és a tervezett gyógykezelési eljárásokról részletesen és körültekintően tájékoztassuk, hogy ez alapján, mindent mérlegelve a döntésben Ön is részt vehessen.

Feladatunkat csak akkor tudjuk kellő színvonalon elvégezni, ha szervezetéről és aktuális állapotáról minél többet tudunk. Ezért célszerű, ha gyógyulása érdekében orvosával és az ápoló személyzettel mindenkor együttműködik, munkánkat segíti.

Epidurális fájdalomcsillapítást a gerinccsatornába adott érzéstelenítő-, illetve erős fájdalomcsillapító gyógyszerekkel végzünk, melyeket egy ide bevezetett műanyag kanülön keresztül akár folyamatosan is adagolhatunk, órákon, vagy ha szükséges, napokon át.

Leggyakrabban a következő esetekben alkalmazzuk:

műtétekhez végzett altatás mellé kiegészítő eljárásként, majd a műtétet követő fájdalomcsillapításra

erős fájdalommal kísért betegségekben a fájdalom csillapítására (pl. hasnyálmirigy gyulladásban, vagy az alsó végtag érszűkület miatti keringészavara által okozott fájdalmakban, illetve némely daganatos betegség által előidézett erős fájdalmak esetén)

szülési fájdalomcsillapításra

Függetlenül a beavatkozást szükségessé tevő állapottól illetve betegségtől, a beavatkozást kórházunk aneszteziológus (érzéstelenítő, altató) orvosa asszisztensek, illetve nővérek segítségével a következő módon végzi (ha annak semmilyen ellenjavallata nem áll fenn):

A beavatkozás előtt az alkar vénájába infúziót kötünk be. Ezután általában ülő helyzetben, a bőr fertőtlenítő lemosását követően a csigolyák közé alkalmazott helyi érzéstelenítés után egy vékony műanyag csövet (kanült) vezetünk be a gerinccsatorna bizonyos csontos külső rétegébe, az úgynevezett epidurális térbe. A műanyag csövet ragtapasszal a hátára leragasztjuk, szabad végét pedig a válla felett rögzítjük. Először egy kis szűrőn át a kanülbe egy úgynevezett teszt dózist adunk, ellenőrizendő a kanül megfelelő helyzetét. Ez utóbbihoz az Ön részéről együttműködés szükséges: amennyiben bármiféle változást észlelne állapotában, azt jelezze. Orvosaink és szakdolgozóink folyamatosan megfigyelik állapotát, általában monitorok segítségével.

A műanyag kanülön keresztül ezután kis adagokban időszakosan, vagy akár folyamatosan adagolunk gyógyszereket.

Mint minden beavatkozás esetén, itt is számolni kell a legnagyobb körültekintés mellett is bekövetkező szövődmények lehetőségével. Megnyugtató, hogy ezen szövődményeket ismerjük, elhárításukra fel vagyunk készülve.

Csökkenő gyakorisági sorrendben a következő **szövődmények** fordulhatnak elő:

- leggyakrabban (<1%) a gerincburok véletlen megsértése, de ez az esetlegesen jelentkező, néhány nap alatt megszűnő fejfájáson kívül egyéb – tartós - egészségkárosodást nem okoz
- vérnyomáscsökkenés, emiatti émelygés és hányás
- átmeneti vizeletürítési zavarok, fájdalom, duzzanat
- véraláfutás a szúrás helyén
- az alsó végtagok átmeneti zsibbadása, gyengesége, esetleg foltos érzéskiesés
- gyulladás, tályog a szúrás helyén, gerinchártya bevérvése, alsó testfél bénulása, nagyritkán akár halálozás is.

XXXXXXXXXXXX

Amennyiben a 3. pontban említett **szülési fájdalomcsillapítás** céljából kerül sor a beavatkozásra, néhány további információval is szeretnénk szolgálni.

A szülésnél közreműködő szülész az aneszteziológussal közösen dönti el, hogy ez az érzéstelenítés alkalmazható-e, vagy nem.

Az epidurális érzéstelenítés alkalmazása lehetővé teszi, hogy Ön gyermeke születésének minden mozzanatát átélhesse. Emellett lepényi véráramlás növelésével a magzat számára is előnyös, ugyanakkor a beadott gyógyszer magzatra gyakorolt hatása elenyésző.

A gyógyszereket olyan formában és mennyiségben adagoljuk, hogy a fájdalmat enyhítsék, de izomgyengeséget ne okozzanak, így Ön a szülésben aktívan részt vehet.

Ez a fájdalomcsillapítás a vajúdás egész ideje alatt fenntartható. Megfelelő gyógyszeradagolás mellett a fájdalomcsillapítás Önt mozgásában nem gátolja.

A módszer a szülés tágulási szakát nem befolyásolja, legfeljebb, azt meggyorsíthatja, míg a kitolási szakaszt valamelyest megnyújthatja.

XXXXXXXXXXXX

Kérjük, forduljon bizalommal az Önt felkereső orvoshoz, és beszélgetésük után a nyilatkozatot írja alá!

Az epidurális fájdalomcsillapításról szóló betegtájékoztatót teljes egészében megismertem, az azzal kapcsolatban szóban feltett kérdéseimre az aneszteziológus orvostól választ kaptam, további kérdésem nincs. A fenti tájékoztatót a megfelelő mérlegelés alapján a beavatkozásba beleegyezem.

Miskolc, év hó nap

.....
a felvilágosítást végző
aneszteziológus orvos aláírás

.....
a beteg, illetve törvényes képviselője,
vagy a nyilatkozattételre jogosult
cselekvőképes személy aláírása