

Betegtájékoztató, kérelem és beleegyező nyilatkozat

Név: #!NEV; **Törzsszám:** #!TORZSSZAM;
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO; **TAJ:** #!TAJ;
Anyja neve: #!BANYJANEVE; **Felvéve:** #!FELVIDO;
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA;

Kedves Betegünk!

Mielőtt hozzájárulását adja az általunk javasolt orvosi ellátáshoz, műtéthez, kérjük ismerkedjen meg a beavatkozás lényegével és lehetséges kockázataival! Döntését tiszteletben tartjuk majd, és legjobb tudásunk szerint azon leszünk, hogy a szóba jövő szövődeményeket elkerüljük, hogy gyógyulását, a szakma szabályait betartva, a tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal elősegítsük.

Dr. Nagy Gábor
mb. osztályvezető főorvos

Terhességmegszakítás

A terhesség megszakítás élő emberi embrió, illetve magzat elpusztítását jelenti. Akkor kerül rá sor, ha valaki a nem kívánt terhességét nem kísérelte meg az ismert védekezési módszerek valamelyikével megelőzni, bekövetkezett terhességét viszont nem kívánja megtartani. A magyar törvények ezt lehetővé teszik. A terhesség megszakítás az ilyen feladatot önként vállaló orvos által szabályos jegyzőkönyv alapján elvégezhető.

A „betegnek” a műtét napján éhgyomorral kell maradnia, felvételét követően WC-re menni, majd zuhanyoznia kell, ékszerait, kivehető fogait el kell távolítani, biztonságba kell helyezni. A műtét intravénás altatásban történik, fájdalommal nem jár, néhány percig tart. Hüvelyi úton még nem szült nők esetében a műtét előtti napon a méh nyakcsatornáját fájdalomtalanul kitágító „Laminária-pálcát” helyezünk fel a méhbe. A műtét során a kitágult, illetve kitágított nyakcsatornán át vákuumcsővel szippantjuk ki, vagy kürettkanállal ürítjük ki a széttroncsolódott embriót és lepényt. 12 hétnél idősebb terhesség megszakítása során oxytocinos infúzióval fájásokat keltünk, és ezt addig folytatjuk (ha kell, ismételjük), amíg a beteg el nem vetéli terhességét. Ezt követően műszeres betapintást kell végezni az esetleg visszamaradt magzat- vagy lepényrészletek eltávolítása céljából. A 12 hétnél idősebb terhességek megszakítása néha több napot vesz igénybe. A műtét napján, a műtétet követő minimum 4-6 óra elteltével fogjuk majd hazabocsátani. Kérjük, vegye igénybe kísérő segítségét. Az érzéstelenítés utóhatásai miatt legkorábban 24 óra múlva szabad aktívan az utcai forgalomban részt vennie, gépkocsit vezetnie vagy gépen dolgoznia, illetve szeszes italt fogyasztania.

1. A műtét kockázatai: A terhesség megszakítás műtét, amelynek reális kockázatai vannak. A beavatkozás közben előforduló lehetséges problémák közül említést érdemelnek a ritkán előforduló aneszteziológiai szövődemények és a méh összehúzódó képességének elégtelensége, vagy a méh műszerek okozta sérülése miatti kisebb-nagyobb vérzések. A terhes méh fala sokszor egyenetlen vastagságú, és néha oly mértékben felpuhul vagy elvékonyodik, hogy a műtétet végző orvos nem képes megérezni, hogy milyen mélységig lehet a műszerekkel (szondával, vákuumcsővel, kürettkanállal) behatolni. Évente 2-4 esetben előfordul a méh falának műtét közbeni átlukadása. Ha ez tompa eszközzel és a méh fenekén történik, akkor megelőzhető a hasműtét, 1-2 napos megfigyelésre azonban a betegnek osztályunkon kell maradnia. Ha a perforáció éles műszerrel történt, vagy a sérülés a méh oldalfalán következett be (ahol nagyobb erek találhatóak), akkor kötelező a hasműtét elvégzése, a vérzés megszüntetése, a sérülés szakszerű ellátása, esetleges bélsérülés esetén a szükséges sebészeti beavatkozás elvégzése. Hasműtét után kb. 7-8 napig kell a betegnek kórházban maradnia.

Terhesség megszakítást követően pár napig kisebb menstruációszerű vérzés várható. Műtét során a méh a hüvely felől, vagy a műtő légtéréből bejutó baktériumok által befertőződhet, ilyenkor méhgyulladás alakulhat ki. Alhasi fájdalmak és hőemelkedés esetén ezért haladéktalanul keresse fel ambulanciánkat! A nyakcsatorna tágítása és a méh belső felszínének sérülései miatt a következő, már kívánt terhességből megnő a spontán vetélés és a koraszülés veszélye. A gyulladások hegesedéssel gyógyulnak, ez a méhkürtök elzáródásához vezethet és meddséget okozhat.

A fentiek alapján is látható, hogy a nem kívánt terhességet lehetőség szerint nem megszakíttatni, hanem sokkal inkább megelőzni kell (tabletták, gumióvszer, méhbe felhelyezhető eszköz stb.). A megszakítás komoly lelkiismeret furdalást okozhat, a műtétnek ritkán, de komoly szövődeményei és egészségkárosító következményei lehetnek. Nem kívánt terhességét igyekezzen tehát megelőzni, ehhez kérje nőgyógyász szakorvos tanácsát!

Kérelem: A fentieket elolvastam, a leírtakat tudomásul vettem. A tervezett műtéti beavatkozás és műtéti érzéstelenítés előnyéről, esetleges mellékhatásáról, következményeiről írásban és szóban tájékoztatást kaptam. További felvilágosítást, tájékoztatást nem kérek. Bízva a javasolt és általam elfogadott műtéti megoldás sikerében, kérem az orvosaim által szükségesnek tartott műtét elvégzését.

Egyetértek azzal,
hogy a szükséges műtétet Dr.
érezstelenítést pedig Dr.

nőgyógyász orvos, a műtéti
aneszteziológus orvos és munkatársai végezzék.
Tudomásul veszem, hogy altatóorvosom a kórházzal megbízási szerződéses jogviszonyban álló
egészségügyi szolgáltató társaság tagja.

Tájékoztatjuk arról, hogy kórházunkban a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak mellett a kórházzal vállalkozási szerződésben álló orvosok és szakdolgozók is tevékenykednek. Így gyógykezelése kapcsán (műtétek-, diagnosztikai és terápiás beavatkozások), Önt a kórházunkkal vállalkozási jogviszonyban lévő munkatársak is elláthatják. Ezt a tényt az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációk tartalmazzák. Amennyiben ezzel kapcsolatos részletes felvilágosítást kér, úgy ezt kezelőorvosa vagy osztályos orvosa megadja.

.....
a felvilágosítást végző orvos aláírása

Miskolc, #!AKTDATUMHONAPNEVVVEL;

.....
beteg olvasható aláírása

.....
vagy a törvényes képviselő aláírása (2)

Beteg neve: #!NEV;
Születési ideje: #!SZULIDO;
Születési helye: #!BSZULHELY;
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA;

Törv. képvis. neve:
Születési ideje:
Születési helye:
Lakcíme:

(1) X-eléssel jelölje meg!

(2) cselekvőképesség hiányában, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá vagy a bejegyzés jogának gyakorlása - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal - megnevezett cselekvőképes személy nem törvényes képviselő.

Az Eü. törvény 15.§ (5) bekezdése szerint az intenzív beavatkozásokhoz a beteg, írásbeli, vagy - amennyiben erre nemképes - két tanú együttes jelenlétében, szóban, vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.

.....
(1) Tanu aláírása

.....
(2) Tanu aláírása

(1) Tanu neve:
Születési dátum:
Lakcím:

(2) Tanu neve:
Születési dátum:
Lakcím: