

TERMOTERÁPIÁS KEZELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ANNAK ESETLEGES SZÖVŐDMÉNYEI

PARAFIN PAKOLÁS

A kezelés menetét és hatása:

A paraffint kb. 50-60 °C fokra felmelegítjük és több rétegben, ecsettel, felvisszük a kezelendő testrészre. Pár másodpercig kellemetlen hőhatást érezni, majd a paraffin gyorsan megszilárdul. Kezelési idő átlag 15-20 perc.

Keringéscsökkentés, fájdalomcsillapítás, a letapadt izmok lazítása, idült ízületi gyulladások kezelése, hegoldás.

Esetleges szövődmények:

- meleg allergia
- akut gyulladás

Kérem, tájékoztasson:

- vérvézéses állapot esetén (thrombosis, bőr alatti bevérzés)
- érzékszavar
- hó allergia esetén

PARAFANGO KEZELÉS

A parafango, iszap és a paraffin keveréke. Rossz hővezető, így 50-55 °C fokon, kb. 2cm vastagságban helyezük fel a kezelendő területre – maximum 2 testtájra.

Pár másodpercig kellemetlen hőhatást fog érezni, majd ez elmúlik és kellemes lesz a hőérzet. Kezelési idő: 20 perc.

Hatása: keringéscsökkentés, fájdalomcsillapítás, a letapadt izmok lazítása, idült ízületi gyulladások kezelése, hegoldás.

Esetleges szövődmények/mellékhatások:

- meleg allergia
- akut gyulladás
- allergia
- szédülés
- vérnyomás emelkedés
- erősödő fájdalom
- helyi izzadás

Kérem, tájékoztasson:

- vérvézéses állapot esetén (thrombosis, bőr alatti bevérzés)
- érzékszavar
- magas vagy ingadozó vérnyomás
- hó-és gyógyszer allergia esetén

TERMOTERÁPIÁS KEZELÉSI ELJÁRÁSOK ÉS ANNAK ESETLEGES SZÖVŐDMÉNYEI

RITEX PAKOLÁS

A kezelés menete és hatása:

A vazelint összekeverjük a Ritex oldattal és a kikevert pakolást vékony rétegben spatulával felkenjük a kezelt testrésztre illetve testrészekre. Nylon lepedővel, illetve fóliával fedjük, majd lepedővel vagy törölközővel betakarjuk. Kezelési idő 15-20 perc.

A krónikus ízületek és az ízületek körüli lágyrészek kezelése, keringésfokozás, fájdalomcsillapítás, a letapadt izmok lazítása.

Esetleges szövődmények:

- túlérzékenységi reakció a készítménnyel szemben (pl. köhögési roham)
- a kezelt bőr felégése
- vérnyomás ingadozás
- fejfájás

A pakolások előtt, ügyeljének arra, hogy a ruhát teljesen távolítsák el a kezelt testrésztől, mert kimosni nagyon nehéz a gyógyszert belőle.

A kezelés előtt, otthonukban, ne használjanak más, gyógyszeres krémet, mert a két gyógyszer keveredése esetén, a mellékhatás nem ismert.

ANTIPHLOGISZTIKUS PAKOLÁS

A kezelés menete és hatása:

Az antiphlogisztikus krémet vékony rétegben spatulával felkenjük a kezelt testrésztre, illetve testrészekre, nylon fóliával befedjük a kezelt területet, majd lepedővel vagy törölközővel betakarjuk.

Kezelési idő 15-20 perc.

Az akut és krónikus ízületek és az ízületek körüli lágyrészek kezelése, keringésfokozás, fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés a letapadt izmok lazítása.

Esetleges szövődmények:

- a készítménnyel szembeni gyógyszerallergiás reakció
- fejfájás

A pakolások előtt, ügyeljének arra, hogy a ruhát teljesen távolítsák el a kezelt testrésztől, mert kimosni nagyon nehéz a gyógyszert belőle.

A kezelés előtt, otthonukban, ne használjanak más, gyógyszeres krémet, mert a két gyógyszer keveredése esetén, a mellékhatás nem ismert.