

Circumcisio (körülmetelés)

A beavatkozástól várható

előny:

- vizelési képesség javulása,
- fityma és makk gyulladás megelőzése,
- a férfi nemi szerv könnyebb tisztítása,
- a körülmetéltekben kisebb arányban fordul elő a férfi nemi szerv rosszindulatú daganata,

A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei (zárójelben az előfordulási gyakoriság nemzetközi statisztikai adatok alapján):

- vérzés, sebgyógyulási zavar, fertőzés,

A beavatkozás menetének rövid leírása: A körülmetelés során a nemi szerv előbőre kerül eltávolításra. A nemi szerv vége bőrének 25-50%-át távolítjuk el, melynek során ollót, kést és elektromos vérzéscsillapítást használunk. A két sebszél öltésekkel (10-20) egyeztetjük. A műtét során a nemi szerv fékjét is átvágjuk, ha az rövid és megoldást igényel.

Hydrocelectomia (Here-vízszerv műtéte)

A beavatkozástól várható előny: A betegséggel kapcsolatos panaszok, ill. a herevívészerv megszűnése.

A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:

- sebgyógyulási zavar, fertőzés
- trombózis: vérrögösödés az alsóvégtag és a kismedence mély visszereiben, tüdőembólia,
- utóvérzés a műtéti területen,
- ondósinór (ondóvezeték, verőér, visszér, nyirokér) sérülés, mely következtében az érintett oldali here, mellékhere részleges vagy teljes elhalása. Ennek következtében nemzőképesség csökkenés, ill. nemzőképtelenség alakulhat ki,
- heresorvadás,

A beavatkozás menetének rövid leírása: Az érintet oldalon herezacskó metszésből a herevívészerv-tömlő kirekesztése, megnyitás, tömlő falának kiirtása, esetleg kifordítása, szükség esetén váladékkivezető cső behelyezése a műtéti területre.

Semicastratio (here eltávolítása)

Tervezett beavatkozás megnevezése: az elhalt vagy gyulladásos gócként szereplő, esetleg daganatos here eltávolítása

A beavatkozástól várható előny: a szervezetre veszélyes gyulladásos vagy daganatos góc megszüntetése.

A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:

- sebgyógyulási zavar,
- gyulladás
- a gyulladás tovaterjedése
- a daganatsejtek a műtét ellenére való távolra sodródása (áttétképzés)

A beavatkozás menetének rövid leírása

Egyszerű hereltávolítás műtétnél : Lágyéktájon, a herezacskóra vezetett metszéssel a here és a herenyél feltárása, a herenyél átvágása, lekötése után a here eltávolítása, a seb zárása.

“Magas” vagy “kiterjesztett” hereltávolításnál: Az előbbi műtétnél jobban a hasfalra vezetett metszésből a herenyél és a here eltávolítása a hasfali izomzat bonyolult részleges átvágásával, hogy a herenyél hosszabb szakaszon legyen eltávolítható. A műtét végén a hasfali rétegek és a seb zárása.

Here visszértágulat, mellékhere cista műtét

Tervezett beavatkozás megnevezése: tágult visszér lekötése, mellékhere cista eltávolítása

A beavatkozástól várható előny: A herében történik a spermaképzés és férfi nemi hormon termelés, s ezek a funkciók a tágult visszerek hatására károsodhatnak. Műtét után a heretáji panaszok, fájdalom csökkenése, hímvarsejt képzés, hormontermelés javulása várható.

A mellékherecysták a mellékhere 1-1 elzáródott csatornájából kialakult, felszaporodott folyadékot tartalmazó üregek, melyek fájdalmat, érzékenységet okoznak. Eltávolításuk fájdalom, nyomási érzékenység esetén indokolt.

A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:

- sebgyógyulási zavar,
- ondóvezeték sérülés,
- továbbra is fennmaradó, vagy visszatérő visszértágulat,
- heresorvadás,
- herevisszér kialakulása, a megváltozott nyirokkeringési viszonyok miatt,
- mellékherecysta eltávolítása után a cista más helyen kiújul, a fájdalom fennmarad

A beavatkozás menetének rövid leírása

Herevisszér műtétnél : Lágyéktájon, vagy a hashártya mögötti térben bal oldalon felkeressük a tágult visszereket, ezeket különválasztjuk az ondósinór többi képletétől, s ezeket az ereket lefogások között átvágjuk, leköjtjük. Ezután a hasfal rétegeit egyesítjük a bőrt zárjuk.

Herecysta eltávolításnál: Lágyéktájon, vagy a herezacskón végzett metszésből felkeressük a cystát, azt eltávolítjuk, a sebet zárjuk.